

Un coup d'aile pour L'HIRONDELLE NOIRE

Préparer son arrivée



L'HIRONDELLE NOIRE arrive assez tôt au printemps : habituellement vers la mi-avril. Ce sont les mâles expérimentés, que l'on appelle « les éclaireurs », qui arriveront en premier pour établir la colonie. Les femelles et les autres mâles atteindront le Québec quelques jours à quelques semaines plus tard.

INSPECTER ET RÉPARER LE NICOIR

Dès que la neige sera fondue, ce sera le moment idéal pour inspecter le nichoir, y compris le système permettant de le descendre



Une fois la neige fondue, ce sera le moment idéal pour inspecter et réparer les nichoirs. © F.D. Richards / Flickr

et de le remonter, ainsi que de procéder aux réparations si nécessaires. Le moment sera également opportun pour faire un ménage du printemps dans les compartiments, en éliminant les vieux nids et en désinfectant le nichoir, si cela n'a pas déjà été fait à l'automne.

L'ATTIRER AU PRINTEMPS VENU

Faire jouer, tôt le matin, un enregistrement du chant que l'Hirondelle noire émet normalement à l'aube (dawnsong) et qui a démontré son potentiel à attirer les individus de cette espèce à venir visiter les environs du nichoir.



Un système avec haut-parleurs a été conçu par la compagnie Bird-X. Il inclut un mode pour attirer spécifiquement l'Hirondelle noire. Le système fait jouer le chant pendant deux heures, à partir du lever du soleil. Pour le branchement, il est doté d'un fil de 50 pieds. Différents commerçants le vendent sur Internet; cherchez le « Songbird magnet bird caller ».

CONTRÔLER LES COMPÉTITEURS

L'Étourneau sansonnet et le Moineau domestique sont deux espèces exotiques envahissantes qui ont été introduites en Amérique du Nord au 19e siècle. Ils peuvent détruire les nids et les œufs de l'Hirondelle noire, ainsi que tuer les oisillons et les adultes. L'Hirondelle noire montre peu de capacité à rivaliser contre l'étrouneau. Par ailleurs, bien qu'elle soit en mesure de chasser le moineau, la ténacité de ce dernier lui permet habituellement de prendre possession des compartiments. Ces espèces compétitrices peuvent



aussi rendre les compartiments indisponibles en les surchargeant de matière végétale. Même la cohabitation avec un seul moineau ou étourneau n'est pas souhaitable. Un seul moineau peut effectivement détruire plus de 15 œufs d'Hirondelle noire en quelques minutes.



Ces deux compétiteurs pourront tenter de prendre possession du nichoir avant que les Hirondelles noires n'arrivent. Il est donc important que les entrées des compartiments restent bloquées et de les ouvrir seulement à l'arrivée des éclaireurs.

Pour suivre précisément la migration des éclaireurs chaque printemps, consultez le site Internet [eBird Québec](#) ou celui du [Purple Martin Conservation Association](#). Québec-Oiseaux vous invite également à soumettre vos propres mentions d'observation sur le site [eBird Québec](#).

CONTRÔLER LES PARASITES

Les parasites comme les punaises, les tiques et les acariens peuvent engendrer de sérieux effets négatifs sur les oisillons et les adultes qui séjourneront dans les nichoirs. Pour minimiser les risques, vous pouvez, au printemps, répartir une cuillère à soupe de terre de diatomée dans chacun des compartiments. Vous pourrez, au besoin, en rajouter à quelques reprises durant l'été.

La terre de diatomée est un produit naturel et non toxique qui agit comme un abrasif sur le corps des parasites. Vous pouvez vous en procurer aux endroits où l'on trouve des insecticides, comme les animaleries et les quincailleries.



Moineau domestique à un nichoir d'Hirondelle noire

© Paul Hurtado / Flickr